

دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

مقایسه آزمایش آگلوتیناسیون رایت و الیزا در افراد مشکوک به بروسلوز

چکیده

زمینه و هدف: در کشور ما اغلب از آزمایش رایت برای تشخیص بروسلوز استفاده می شود. به علت حساسیت پایین این آزمایش موارد منفی کاذب بالا گزارش می شود. در این مطالعه نتایج آزمون های رایت و الیزا در افراد مشکوک به بروسلوز مورد مقایسه قرار گرفت. **روش بررسی:** نتایج آزمون رایت، 2ME رایت، کومبس رایت و تعیین کلاس های Igm IgG علیه بروسلا به روش الیزا مورد ارزیابی قرار گرفت. از مجموع ۱۱۸۳ افراد با آزمایش رایت ارجاع داده شده، ۱۴۸ مورد آزمون کومبس رایت و ۲۲۸ مورد آزمون 2ME رایت برای آنها درخواست شده بود. برای ۳۲ نفر از آنها علاوه بر آزمون رایت، آزمایش های سنجش آنتی بادی بر علیه بروسلا از کلاس های Igm و IgG نیز انجام شد.

یافته ها: آزمون رایت در ۹۵/۴ درصد موارد منفی بود. ۸/۷ درصد موارد از لحاظ آزمایش کومبس رایت و ۴/۷ درصد از آن ها از لحاظ آزمایش 2ME رایت مثبت بودند و در ۲/۳ درصد موارد رایت منفی، کومبس رایت مثبت بود. ۱۶ نفر از لحاظ آزمون رایت و الیزا منفی بودند. در ۸ مورد رایت منفی، الیزا از کلاس Igm مثبت و IgG منفی و ۴ مورد رایت منفی، الیزا از لحاظ Igm منفی و IgG مثبت بود. همچنین ۴ مورد از لحاظ رایت مثبت و آنتی بادی از کلاس Igm و IgG مثبت بودند.

نتیجه گیری: به علت عدم هم خوانی نتایج آزمایش های رایت و الیزا با توجه به در دسترس بودن، حساسیت بالا و تعیین نوع کلاس آنتی بادی در روش الیزا این روش برای تشخیص بروسلوز مورد تاکید می باشد.

واژه های کلیدی: بروسلوز، رایت، الیزا

حسین انصاری نیا

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

فاطمه زارع

کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

حسین هادی ندوشن

دانشیار ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی، یزد، ایران

نویسنده مسئول: حسین هادی ندوشن

پست الکترونیک: hhadin@ssu.ac.ir

تلفن: ۰۹۱۳۳۵۷۶۶۲۰

آدرس: ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دریافت: ۹۱/۷/۱۵

ویرایش پایانی: ۹۱/۱۱/۱۸

پذیرش: ۹۱/۱۱/۲۱

آدرس مقاله:

انصاری نیا ح، زارع ف، هادی ندوشن ح "مقایسه آزمایش آگلوتیناسیون رایت و الیزا در افراد مشکوک به بروسلوز" مجله علوم
آزمایشگاهی، ویژه نامه باکتری شناسی ۱۳۹۲ دوره هفتم (شماره ۵): ۴۵-۵۰

مقدمه

بروسلوز یکی از بیماری‌های شایع مشترک بین انسان و حیوان در جهان است که به طور عمده در کشاورزان، کارگران کشتارگاه‌ها و دامپزشکان از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با حیوانات آلوده یا محصولات آن‌ها رخ می‌دهد (۲،۱). عامل این بیماری گونه‌های مختلف بروسلوز هستند که باسیل‌هایی گرم منفی، کوچک، هوازی، غیرمتحرک، فاقد کپسول و اسپور می‌باشند (۵). تشخیص قطعی بروسلوز جدا کردن باکتری از خون، مایعات یا بافت‌های بدن است، اما این روش به دلیل محدودیت‌هایی از جمله رشد آهسته‌ی باکتری، عدم رشد در محیط‌های کشت معمولی و احتمال آلودگی کارکنان آزمایشگاه معمولاً در تشخیص بروسلوز استفاده نمی‌شود. همچنین در اکثر موارد، کشت خون در عفونت‌های تحت حاد منفی می‌شود. حساسیت کشت خون در مطالعات مختلف بین ۱۵ تا ۳۵ درصد گزارش شده است (۹،۸). روش‌های متداول مورد استفاده برای تشخیص سرولوژیک بروسلوز شامل آزمایش آگلوتیناسیون (Coombs Wright, 2ME Wright Wright)، آزمایش فیکساسیون کمپلمان (CFT) و (ELISA (IgM, IgG می‌باشد (۱۱،۱۰). یکی از روش‌های سرولوژیکی، سروآگلوتیناسیون یا آزمایش رایت می‌باشد که به طور شایع در تشخیص بروسلوز استفاده می‌شود. آزمایش کومبس رایت در مواردی که آزمایش رایت منفی می‌شود و ممکن است این جواب منفی به علت وجود آنتی‌بادی‌های بلوکان باشد، استفاده می‌گردد. الیزا یکی از روش‌های سنجش پاسخ سیستم ایمنی بوده که در فاز جامد انجام می‌گیرد و به همین دلیل بسیاری از عیوب روش‌های سنجش ایمنی در فاز مایع از جمله زمان طولانی روش، آماده‌سازی اولیه و اتصالات غیراختصاصی بالا در این روش مشاهده نمی‌شود (۱۲). در آزمایش آگلوتیناسیون از *Brucella Abortus* به عنوان آنتی‌ژن استفاده می‌شود که با سایر گونه‌های بروسلوز به جز *Canis* واکنش متقاطع دارد. همچنین امکان ایجاد واکنش متقاطع سرولوژیکی بین گونه‌های بروسلوز، یرسینیا، فرانسیلا تولارنسیس، و ویبریو

کلرا و گونه‌های سالمونلا وجود دارد. آزمایش الیزا توانایی اندازه‌گیری تمام آنتی‌بادی‌هایی که توسط گونه‌های مختلف بروسلوز در بدن انسان ایجاد می‌شود را دارد (۱۳)، (۱۴). در مطالعه Araj و همکاران مشخص شد که روش الیزا باید در موارد مزمن و مواردی که تشخیص بروسلوز دشوار است، استفاده شود (۱۵). مطالعه دیگر در عربستان نشان داد که الیزا آزمون مناسبی است و حساسیت و ویژگی آن در مقایسه با کشت خون به ترتیب ۹۹ و ۱۰۰ درصد تعیین شد (۱۶). در مطالعه ای که در اسپانیا توسط Serra و همکاران صورت گرفت نشان داده شد که حساسیت و ویژگی آزمون الیزا در مقایسه با کشت خون به ترتیب ۹۹ و ۹۸/۸ درصد می‌باشد (۱۷). در مطالعه ای که توسط محرز و همکاران برای ارزیابی آزمون سرولوژی الیزا در تشخیص بروسلوز در بیمارستان امام خمینی در سال ۱۳۷۹ انجام گرفت مشاهده شد که حساسیت و ویژگی ELISA (IgG) ۹۳ و ۱۰۰ درصد و ELISA (IgM) ۹۶ و ۱۰۰ درصد می‌باشد (۱۸). با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده در مطالعات مختلف به دلیل استفاده از کیت‌های متنوع از شرکت‌های مختلف، این مطالعه به منظور مقایسه آزمون‌های رایت و الیزا در افراد مشکوک به بروسلوز انجام گرفت. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش آگلوتیناسیون در مقایسه با الیزا در تشخیص افراد مشکوک به بروسلوز بود.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی - مقطعی اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمون Coombs Wright, 2ME Wright, Wright (به روش آگلوتیناسیون لوله ای) و بروسلوز IgM, IgG (به روش ELISA) از فروردین ماه تا اسفند ماه ۱۳۸۹ در افراد مشکوک به بروسلوز ارجاعی به آزمایشگاه بوعلی یزد مورد ارزیابی قرار گرفت. از مجموع ۱۱۸۳ فرد با آزمایش رایت ارجاع داده شده، ۱۴۸ مورد آزمایش کومبس رایت و ۲۲۸ مورد آزمون برای آنها درخواست شده بود. برای ۳۲ نفر از آنها علاوه بر آزمون رایت، آزمایش‌های سنجش

درخواست این آزمایش ها توسط پزشک برای غربالگری بیماران که علائم غیراختصاصی بروسلوز را دارند باشد. عدم همخوانی نتایج آزمایش های آگلوتیناسیون رایت و روش الیزا در تعیین آنتی بادی علیه بروسلا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نتیجه منفی کاذب رایت ممکن است به علت وجود آنتی بادی های بلوکان، وجود پدیده پروزون و همچنین در مبتلایان به بروسلوز ناشی از گونه *Canis* دیده شود، زیرا این گونه از بروسلا معمولا آنتی ژن استاندارد بروسلا را به علت نداشتن تشابه آنتی ژنی با یکدیگر، آگلوتینه نمی کند و نتایج کاذب مثبت ممکن است به علت عفونت به باکتری های *Salmonella spp*, *Yersinia*, *Vibrio cholera* ایجاد شود (۲۰). چون در آزمایش الیزا از اپی توپ های آنتی ژن که اختصاصی بروسلا است استفاده می شود، احتمال ایجاد واکنش متقاطع با باکتری های دیگر کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به در دسترس بودن، حساسیت بالا و تعیین نوع کلاس آنتی بادی در روش الیزا عدم مشاهده پدیده پروزون یا آنتی بادی های بلوکان در آن پیشنهاد می شود که این روش جایگزین آزمایش رایت در آزمایشگاه شود. استفاده از آزمایش حساس الیزا برای بیمارانی که در مراحل اولیه بیماری هستند و یا مقادیر آنتی بادی تولیدی در آنان کم است و این میزان کم آنتی بادی در سرم آنها با روش های رایت و کومبس رایت قابل شناسایی نیست، توصیه می شود. در این مطالعه حساسیت آزمون رایت در مقایسه با آزمون الیزا، ۲۵ درصد و ویژگی این آزمون ۱۰۰ درصد بود. نتایج شاخص حساسیت مطالعه ما در مقایسه با بررسی های دیگر کمتر به دست آمده است که به نظر می رسد، علت آن تفاوت در کیت های مورد استفاده و شرایط متفاوت آزمایشگاهی باشد. حساسیت و ویژگی آزمایش الیزا در مطالعات مختلف، متفاوت گزارش شده است. براساس مطالعه ای که در عربستان توسط Memish و همکاران در سال ۲۰۰۲ بر روی ۶۸ بیمار مبتلا به بروسلوز با کشت خون مثبت و ۷۰ نفر گروه شاهد انجام شده است. حساسیت آزمایش آگلوتیناسیون برای بیماران مبتلا به بروسلوز ۹۵/۶ درصد و ویژگی آن ۱۰۰ درصد

آنتی بادی بر علیه بروسلا از کلاس های IgM و IBL, Germany Sensitivity) $>95\%$ ، $>95\%$ ، Specificity) نیز انجام شد. نتایج به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

میانگین سنی افراد مراجعه کننده $38/7 \pm 17$ سال بود. حداقل سن، ۲ سال و حداکثر ۸۵ سال بود. ۵۸/۱ درصد آنها زن و ۴۱/۹ درصد مرد بودند. نتیجه آزمایش رایت در ۹۵/۴ درصد موارد منفی بود. ۰/۴ درصد تیتراژ ۱/۸۰، ۲/۱ درصد تیتراژ ۱/۱۶۰، ۱/۶ درصد تیتراژ ۱/۳۲۰ و ۳/۳ درصد تیتراژ ۱/۶۴۰ و بالاتر را نشان می دادند. ۸/۷ درصد موارد از لحاظ آزمایش کومبس رایت و ۴/۷ درصد از آنها از لحاظ آزمایش 2ME رایت مثبت بودند و در ۲/۳ درصد موارد رایت منفی، کومبس رایت مثبت بود. از مجموع ۳۲ نفر که آزمون رایت و ELISA (IgG, IgM) برای آنها انجام گرفت در ۱۶ مورد (۵۰٪) افراد از لحاظ آزمون رایت و الیزا منفی بودند. ۸ مورد رایت منفی، الیزا از کلاس IgM مثبت و IgG منفی و ۴ مورد رایت منفی، الیزا از لحاظ IgM منفی و IgG مثبت بود. همچنین ۴ مورد از لحاظ رایت مثبت و همچنین آنتی بادی از کلاس IgM و IgG مثبت بودند. در این مطالعه حساسیت آزمون رایت در مقایسه با آزمون الیزا، ۲۵ درصد و ویژگی این آزمون ۱۰۰ درصد بود.

بحث

به دلیل شناخت علائم بالینی ضعیف، ناکافی و ناهمگون، تشخیص بروسلوز همواره نیازمند یک روش تشخیص حساس، اختصاصی، سریع، تکمیل شونده، ارزان و ساده در طراحی و اجرا هست. این روش ها می تواند بسیاری از محدودیت های روش های سنتی را برطرف سازد (۱۹). آزمون آگلوتیناسیون رایت روشی ارزان و ساده برای تشخیص بروسلوز می باشد. اما ۹۵/۴ درصد موارد منفی در آزمایش های درخواستی توسط پزشکان جای تأمل دارد. این درصد بالای نتایج منفی می تواند به علت

گزارش شده است (۲۵). در مطالعه ERTEK و همکاران حساسیت روش IgG ۸۱/۳ درصد و روش IgM ۹۳/۸ درصد و اختصاصیت IgG ۹۵ درصد و IgM ۸۵ درصد گزارش شد (۲۶). با توجه به این مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که آزمایش الایزا IgG, IgM از حساسیت و ویژگی نسبتا بالایی در تشخیص قطعی افراد مشکوک به بروسلوز برخوردار است.

نتیجه گیری

اگر چه آزمایش رایت به علت ارزانی و سهولت در اجرا، ممکن است در بروسلوز حاد نسبت به روش الایزا ترجیح داده شود اما حساسیت پایین این آزمون باعث می شود که موارد کاذب منفی آن زیاد باشد. با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که نمی توان به صحت آزمایش رایت امیدوار بود و با در دسترس بودن، حساسیت بالا، تعیین نوع کلاس آنتی بادی و عدم مشاهده پدیده پروزون یا آنتی بادی های بلوکان در روش ELISA، پیشنهاد می شود که این روش جایگزین آزمایش آگلوتیناسیون رایت در آزمایشگاه ها شود.

تشکر و قدردانی

از همکاری کلیه کارکنان آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی یزد که در انجام آزمون ها ما را یاری دادند و نیز آقای مهدی دهقان منشادی که در ویرایش مقاله مشارکت داشته اند، قدردانی و تشکر به عمل می آید.

References

1. Park SH, Lee YH, Chu H, Hwang SD, Hwang KJ, Choi HY, et al. *Application of the Microagglutination Test for Serologic Diagnosis of Human Brucellosis*. Osong Public Health and Research Perspectives. 2012; 3(1): 19-23.
2. Aliskan H. *The value of culture and serological methods in the diagnosis of human brucellosis*. Mikrobiyol Bul. 2008; 42(1): 185-95.
3. del Pozo SG, Solera J. *Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials in the Treatment of Human Brucellosis*. PloS one. 2012; 7(2): e32090.
4. Citak EC, Citak FE, Tanyeri B, Arman D. *Hematologic manifestations of brucellosis in children: 5 years experience of an anatolian center*. J Pediatr Hematol Oncol. 2010; 32(2): 137-40.
5. Parsa N, Almasi Hashiani A. *Brucella bacterium induces infection and human cancers: Review Article*. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2012; 14(7): 95-99. [Persian]

گزارش شده است. در حالی که حساسیت آزمایش الایزا-IgG ۴۵/۶ درصد و ویژگی آن ۹۷/۱ درصد و حساسیت آزمایش الایزا IgM- ۷۹/۱ درصد و ویژگی آن ۱۰۰ درصد بوده است (۲۱). در مطالعه ای که توسط سلیمانی و همکاران در درمانگاه تخصصی عفونی شهر کاشان در سال ۱۳۸۳ برای تشخیص بروسلوز بر روی ۳۱ نفر انجام شد، نتایج آزمایشات نشان داد که آزمون آگلوتیناسیون رایت و کومبس رایت در ۲۰ نفر از افراد مورد مطالعه مثبت بود. نتیجه آزمون الایزا (IgM) در ۲۴ نفر از بیماران و نتیجه آزمون الایزا (IgG) در ۲۳ نفر از بیماران مثبت بود. به این ترتیب حساسیت و ویژگی آزمون الایزا (IgM) در مقایسه با آزمون آگلوتیناسیون به ترتیب ۱۰۰ و ۶۳/۳ درصد و آزمون الایزا (IgG) به ترتیب ۱۰۰ و ۷۲/۷ درصد تعیین گردید (۲۲). همچنین در مطالعه وکیلی و همکاران، ویژگی آزمون الایزا (IgG) ۷۰/۶ درصد و IgM ۱۰۰ درصد محاسبه شد و حساسیت آزمون الایزا (IgG) ۹۳/۷ درصد و IgM ۱۲/۵ درصد به دست آمد. در این مطالعه آزمون آگلوتیناسیون به عنوان روش طلایی در نظر گرفته شده بود (۲۳). در مطالعه Gómez و همکاران حساسیت IgG و IgM ۸۴ درصد و ۶۰ درصد و ویژگی هر دو ۱۰۰ درصد گزارش شد (۲۴). در مطالعه Ciftci در ترکیه که از کشت خون به عنوان استاندارد طلایی استفاده شده بود، حساسیت الایزا (IgG) ۹۷/۱ درصد، الایزا (IgM) ۷۱/۴ درصد

6. Mantecon Mde L, Gutierrez MP, Zarzosa Mdel P, Fernandez-Lago L, Colmenero Jde D, Vizcaino N, et al. *Influence of brucellosis history on serological diagnosis and evolution of patients with acute brucellosis*. J Infect. 2008; 57(5): 397-403.
7. Pappas G, Christou L, Akritidis N, Tsianos EV. *Quinolones for brucellosis: treating old diseases with new drugs*. Clin Microbiol Infect. 2006; 12(9): 823-5.
8. Delpino MV, Fossati CA, Baldi PC. *Occurrence and potential diagnostic applications of serological cross-reactivities between Brucella and other alpha-proteobacteria*. Clin Diagn Lab Immunol. 2004; 11(5): 868-73.
9. Sanaei Dashti A, Karimi A, Javad V, Shiva F, Fallah F, Alaei MR, et al. *ELISA Cut-off Point for the Diagnosis of Human Brucellosis; a Comparison with Serum Agglutination Test*. Iran J Med Sci. 2012; 37(1): 9-14.

22. Esalatmanesh K, Soleimani Z, Arj A, Akbari H, Salehi M. *Diagnostic value of ELISA (IgG and IgM) test in brucellosis patients in Kashan during 2004*. KAUMS Journal (FEYZ). 2008; 12 (3) :47-50.
23. Vakili Z , Momen Heravi M , Sharif A , Masoomi M. *Sensitivity and specificity of ELISA test in the diagnosis of brucellosis*. Kowsar Medical Journal . 2010 ; 15 (2) :95-98.
24. Gomez MC, Nieto JA, Rosa C, Geijo P, Escribano MA, Munoz A, et al. *Evaluation of seven tests for diagnosis of human brucellosis in an area where the disease is endemic*. Clin Vaccine Immunol. 2008; 15(6): 1031-3.
16. Gad El-Rab MO, Kambal AM. *Evaluation of a Brucella enzyme immunoassay test (ELISA) in comparison with bacteriological culture and agglutination*. J Infect. 1998; 36(2): 197-201.
17. Serra J, Vinas M. *Laboratory diagnosis of brucellosis in a rural endemic area in northeastern Spain*. Int Microbiol. 2004; 7(1): 53-8.
- 18- Mohraz M, Kariminia A, Sarafnejad A, Almaee Z. *Evaluation of DOT- ELISA in diagnosis of brucellosis in Imam Khomeini hospital, 2000*. Iran J Infec Dis Trop Med. 2003; 23(8):10-13. [Persian]
19. Young EJ. *Human brucellosis*. Clin Infect Dis. 1983; 5(5): 821-842.
20. Gazapo E, Gonzalez Lahoz J, Subiza JL, Baquero M, Gil J, de la Concha EG. *Changes in IgM and IgG antibody concentrations in brucellosis over time: importance for diagnosis and follow-up*. J Infect Dis. 1989; 159(2): 219-25.
21. Memish ZA, Almuneef M, Mah MW, Qassem LA, Osoba AO. *Comparison of the Brucella Standard Agglutination Test with the ELISA IgG and IgM in patients* 2002; 44(2): 129-132.
25. Ciftci C, Ozturk F, Oztekin A, Karaoglan H, Saba R, Gultekin M, et al. *Comparison of the serological tests used for the laboratory diagnosis of brucellosis*. Mikrobiyol Bul. 2005; 39(3): 291-9.
26. Ertek M, Yazgi H, Ozkurt Z, Ayyildiz A, Parlak M. *Comparison of the diagnostic value of the standard tube agglutination test and the الایزا IgG and IgM in patients with brucellosis*. Turkish Journal of Medical Sciences. 2006;36(3):159-163.
10. Praud A, Gimenez O, Zanella G, Pozzi N, Antras V, Meyer L, et al. *Evaluation of five serological tests for the diagnosis of porcine brucellosis in French Polynesia*. Tropical Animal Health and Production. 2013; 45(4): 931-3.
11. Al-Attas RA, Al-Khalifa M, Al-Qurashi AR, Badawy M, Al-Gualy N. *Evaluation of PCR, culture and serology for the diagnosis of acute human brucellosis*. Ann Saudi Med. 2000; 20(3-4): 224-8.
12. Crowther JR. *The ELISA guidebook*: Humana Press. 2002;
13. Cutler SJ, Zygmunt MS, Garin Bastuji B. *Brucella Species: Brucellosis. in: BSL3 and BSL4 Agents. Epidemiology, Microbiology, and Practical Guidelines*. Wiley-Blackwell. 2012; 19-35.
14. Longo DL, Kasper DL, Jameson JL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J. *Harrison's™ Principles Of Internal Medicine*. McGraw-Hill; 2012;
15. Araj GF, Kattar MM, Fattouh LG, Bajakian KO, Kobeissi SA. *Evaluation of the PANBIO Brucella immunoglobulin G (IgG) and IgM enzyme-linked immunosorbent assays for diagnosis of human brucellosis*. Clin Diagn Lab Immunol. 2005; 12(11): 1334-5.

Comparison of Wright Agglutination Test and ELISA in Diagnosis of Brucellosis

Ansarinia, H.

BSc Student of the Science Laboratory,
Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences, Yazd, Iran

Zare, F. (BSc)

MSc Student of Immunology, Shahid
Sadoughi University of Medical Sciences,
Yazd, Iran

Hadinedoushan, H. (PhD)

Associate Professor of Immunology,
Department of Immunology, Shahid
Sadoughi University of Medical Sciences,
Yazd, Iran

Corresponding Author: Hadinedoushan, H.

Email: ansarssu@yahoo.com

Received: 6 Oct 2012

Revised: 6 Feb 2013

Accepted: 9 Feb 2013

Abstract

Background and Objective: In our country, the Wright test routinely is used for diagnosing brucellosis. Because of its low sensitivity, the range of false-negative results is high. Therefore, we aimed at comparing Wright and ELISA in the people suspected brucellosis.

Material and Methods: The results of Wright, 2ME, Coombs Wright tests were compared with Anti-Brucella IgG, Anti-Brucella IgM. Of 1183 subjects referred for Wright test, 148 of them were investigated for Coombs Wright and 228 for 2ME Wright. In addition to Wright test for 32 cases, Brucella IgG and IgM classes were also experimented.

Results: Wright test was negative in 95.4% of cases. Of these negative results, 2.3% were positive for Coombs Wright. Eight-point-five percent of the cases were positive for Coombs Wright test and 4.7% for 2ME Wright test. Sixteen cases were negative for both Wright and ELISA. In 8 cases of Wright-negative, ELISA IgM class was positive and IgG class was negative, and in 4 cases of Wright-negative, ELISA IgM was negative and IgG was positive. About 4 cases of Wright-positive, IgM and IgG antibody classes were positive.

Conclusion: Due to the mismatch between the results of Wright agglutination test and ELISA method and with regard to availability, high sensitivity and determining the type of antibody classes in ELISA, it is focused on ELISA method for brucellosis diagnosis.

Keywords: Brucellosis; Wright; ELISA